

財團法人大學入學考試中心基金會
112學年度學科能力測驗試題

數學B考科

請於考試開始鈴響起，在答題卷簽名欄位以正楷簽全名

—作答注意事項—

考試時間：100分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正帶（液）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。
- 選填題考生必須依各題的格式填答，且每一個列號只能在一個格子劃記。請仔細閱讀下面的例子。

例：若答案格式是 $\frac{18-1}{18-2}$ ，而依題意計算出來的答案是 $\frac{3}{8}$ ，則考生必須分別在答題卷上

的第 18-1 列的 $\frac{3}{\square}$ 與第 18-2 列的 $\frac{\square}{8}$ 劃記，如：

18-1	$\frac{1}{\square}$	$\frac{2}{\square}$	$\frac{3}{\blacksquare}$	$\frac{4}{\square}$	$\frac{5}{\square}$	$\frac{6}{\square}$	$\frac{7}{\square}$	$\frac{8}{\square}$	$\frac{9}{\square}$	$\frac{0}{\square}$	$\frac{-}{\square}$	$\frac{\pm}{\square}$
18-2	$\frac{1}{\square}$	$\frac{2}{\square}$	$\frac{3}{\square}$	$\frac{4}{\square}$	$\frac{5}{\square}$	$\frac{6}{\square}$	$\frac{7}{\square}$	$\frac{8}{\blacksquare}$	$\frac{9}{\square}$	$\frac{0}{\square}$	$\frac{-}{\square}$	$\frac{\pm}{\square}$

例：若答案格式是 $\frac{19-1}{50}$ ，而答案是 $\frac{-7}{50}$ 時，則考生必須分別在答題卷的第 19-1 列

的 $\frac{\square}{\square}$ 與第 19-2 列的 $\frac{7}{\square}$ 劃記，如：

19-1	$\frac{1}{\square}$	$\frac{2}{\square}$	$\frac{3}{\square}$	$\frac{4}{\square}$	$\frac{5}{\square}$	$\frac{6}{\square}$	$\frac{7}{\square}$	$\frac{8}{\square}$	$\frac{9}{\square}$	$\frac{0}{\square}$	$\frac{-}{\blacksquare}$	$\frac{\pm}{\square}$
19-2	$\frac{1}{\square}$	$\frac{2}{\square}$	$\frac{3}{\square}$	$\frac{4}{\square}$	$\frac{5}{\square}$	$\frac{6}{\square}$	$\frac{7}{\blacksquare}$	$\frac{8}{\square}$	$\frac{9}{\square}$	$\frac{0}{\square}$	$\frac{-}{\square}$	$\frac{\pm}{\square}$

選擇（填）題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。
- 選填題每題有 n 個空格，須全部答對才給分，答錯不倒扣。


※試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

第壹部分、選擇（填）題（占85分）

一、單選題（占 35 分）

說明：第 1 題至第 7 題，每題 5 分。

1. 某抽水站發現其用電量（單位：度）與抽水馬達轉速（單位：rpm）的三次方成正比。根據上述，試問下列這五個圖中，哪一個最可以描述此抽水站的用電量 y （度）與抽水馬達轉速 x （rpm）的對應關係？



2. 考慮實數二階方陣 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ，若 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -9 & -7 \end{bmatrix}$ ，則 $c - 2b$ 的值為何？

- (1) -11 (2) -4 (3) 1 (4) 10 (5) 11

3. 地面上有甲、乙兩大樓，已知甲的高度大於乙，且甲、乙兩大樓的水平距離為 150 公尺。某人從甲樓頂拉一條繩索到乙樓頂，並從甲樓頂測得乙樓頂的俯角為 22° 。假設該繩索被拉成直線，試問繩索的長度（單位：公尺）最接近下列哪個選項？（註：眼睛往下看目標物時，視線與水平線間的夾角稱為俯角）

- (1) 150 (2) $150\sin 22^\circ$ (3) $150\cos 22^\circ$ (4) $\frac{150}{\cos 22^\circ}$ (5) $\frac{150}{\sin 22^\circ}$

4. 某校期中考試有 29 名考生，且成績均相異，統計後得到位於第 25、第 50、第 75 與第 95 百分位數的考生成績分別為 41、60、74 與 92 分。後來發現成績有誤需要調整分數，成績較高的前 15 名學生的分數應該要各加 5 分，其餘學生成績不變。假設調整後第 25、第 50、第 75 與第 95 百分位數的考生成績分別為 a 、 b 、 c 與 d 分，則數組 (a, b, c, d) 為下列哪個選項？

- (1) (41, 60, 74, 92) (2) (41, 60, 74, 97) (3) (41, 65, 79, 97)
(4) (46, 65, 79, 92) (5) (46, 65, 79, 97)

5. 袋子裡有編號分別為 $1, 2, \dots, 100$ 的 100 顆球，某甲從袋中隨機抽取一球，每顆球被抽到的機率均相等。試問在下列哪個選項的條件下，某甲抽到 7 號球的條件機率最大？


- (1) 某甲抽到球的號碼是奇數
- (2) 某甲抽到球的號碼是質數
- (3) 某甲抽到球的號碼是 7 的倍數
- (4) 某甲抽到球的號碼不是 5 的倍數
- (5) 某甲抽到球的號碼小於 10

6. 某甲計算多項式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 除以 $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的餘式，其中 a, b, c, d 為實數，且 $a \neq 0$ 。他誤看成 $g(x)$ 除以 $f(x)$ ，計算後得出餘式為 $-3x - 17$ 。假設 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 正確的餘式等於 $px^2 + qx + r$ ，則 p 的值會等於下列哪個選項？

- (1) -3
- (2) -1
- (3) 0
- (4) 2
- (5) 3

7. 已知某手電筒照射的光線為直圓錐狀，且光發散的夾角為 60° ，如圖所示。設牆壁與地板垂直且交界處為直線 L ，將此手電筒以垂直於 L 的方向照射，即此直圓錐的軸與 L 垂直。若手電筒照射在牆壁上的光線邊緣為拋物線的一部份，則在地板上的光線邊緣為下列哪種圖形的一部份？

- (1) 兩相交直線
- (2) 圓形
- (3) 拋物線
- (4) 長短軸不相等的橢圓
- (5) 雙曲線



二、多選題（占 25 分）

說明：第 8 題至第 12 題，每題 5 分。

8. 某電子看板持續不斷的輪流播放 A 、 B 兩段廣告（ A 、 B 、 A 、 B ...），每個廣告播放時間皆為 T 分鐘（其中 T 為整數）。某甲經過時剛好開始播放 A 廣告，30 分鐘後，某甲回到該處，看到恰好開始播放 B 廣告。試選出可能是 T 值的選項。

(1) 15 (2) 10 (3) 8 (4) 6 (5) 5

9. 已知 $a=6$ 、 $b=\frac{20}{3}$ 、 $c=2\sqrt{10}$ 和 d ，且 d 為有理數，將這四個數標註在數線上，

即 $A(a)$ 、 $B(b)$ 、 $C(c)$ 和 $D(d)$ 。試選出正確的選項。

- (1) $a+b+c+d$ 必為一個有理數
(2) $abcd$ 必為一個無理數
(3) 點 D 有可能與點 C 的距離等於 $2\sqrt{10}+6$
(4) 點 A 和點 B 的中點位在點 C 的右邊
(5) 數線上和點 B 距離小於 8 的所有點中，正整數有 14 個，負整數有 1 個

10. 某機構在 12 點時將兩種不同的營養劑分別投入培養皿甲與培養皿乙中，此時甲、乙的細菌數量分別為 X 、 Y 。已知甲的數量每 3 小時成長為原來的 2 倍，例如 15 點時甲的數量為 $2X$ 。乙的數量每 2 小時成長為原來的 2 倍，例如 14 點時乙的數量為 $2Y$ 、16 點時乙的數量為 $4Y$ ，測量所得結果部分記錄於下表。該機構在 18 點時測量發現甲、乙的數量相同，欲以細菌數量隨時間呈指數成長的模型來預估甲、乙 12 點至 24 點的細菌數量。根據上述，試選出正確的選項。

時刻（點）	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
甲數量	X			$2X$									
乙數量	Y		$2Y$		$4Y$								

- (1) $X > Y$
(2) 在 13 點時，甲的數量為 $\frac{4}{3}X$
(3) 在 15 點時，乙的數量為 $3Y$
(4) 在 19 點時，乙的數量為甲的 1.5 倍
(5) 在 24 點時，乙的數量為甲的 2 倍

11. 坐標平面上有一圓，其圓心為 $A(a, b)$ ，且此圓與兩坐標軸皆相切，另有一點 $P(c, c)$ ，其中 $a > c > 0$ ，且已知 $\overline{PA} = a + c$ ，試選出正確的選項。

- (1) $a = b$
- (2) 點 P 位於直線 $x + y = 0$ 上
- (3) 點 P 在此圓內
- (4) $\frac{a+c}{b-c} = \sqrt{2}$
- (5) $\frac{a}{c} = 2 + 3\sqrt{2}$

12. 在球心為 O 的球形地球儀上，有 A 、 B 、 C 、 D 、 E 五個點，其中 A 、 B 、 C 三點都在赤道上，且經度分別為東經 0° 、 60° 和 90° ； D 、 E 兩點都在北緯 30° 線上，且經度分別為東經 0° 、 180° 。試選出正確的選項。

- (1) 赤道的長度等於東經 0° 和 180° 這兩條經線長度的總和
- (2) 北緯 45° 線的長度等於赤道長度的 $\frac{1}{2}$
- (3) 「由 A 沿赤道移動到 B 的最短路徑長」等於「由 D 沿東經 0° 經線移動到北極點的路徑長」
- (4) 「由 D 沿北緯 30° 線移動到 E 的路徑長」等於「由 D 沿東經 0° 經線移動到北極點，再由北極點沿東經 180° 經線移動到 E 的路徑長的總和」
- (5) 通過北極點與 A 點的直線與通過北極點與 C 點的直線互相垂直

三、選填題（占 25 分）

說明：第 13 題至第 17 題，每題 5 分。


13. 有兩個正實數 a 、 b ，已知 $ab^2 = 10^5$ ， $a^2b = 10^3$ ，則 $\log b = \frac{\textcircled{13-1}}{\textcircled{13-2}}$ 。（化為最簡分數）

14. 從 1 到 20 的 20 個整數中，取出相異的 3 個數 a 、 b 、 c ，使其成為等差數列，且 $a < b < c$ ，

則 (a, b, c) 的取法有 (14-1) (14-2) 種。


15. 如圖所示，平面上有一點 P_0 先朝某方向前進 2 個單位長到達點 P_1 後，依前進方向左轉 15 度；朝新方向前進 2 個單位長到達點 P_2 後，然後再依前進方向左轉 15 度；再朝新方向前進 2 個單位長到達點 P_3 後，…依此類推。

則向量 $\overrightarrow{P_2P_3}$ 與 $\overrightarrow{P_5P_6}$ 的內積為 (15-1) $\sqrt{(15-2)}$ 。（化為最簡根式）



16. 正方形紙張上有一點 P ， P 點距離紙張左邊界 6 公分，距離下邊界 8 公分。今將紙張的

左下角 O 點往內摺至 P 點，如圖所示。則摺進去的三角形面積是 (16-1) (16-2) (16-3) 平方公分。



17. 考慮所有只用 0, 1, 2 三種數字組成的序列，序列長度 n 是指該序列由 n 個數字組成（可重複出現）。令 $a(n)$ 為在所有長度 n 的序列中連續兩個零（即 00）出現的次數總和。

例如長度 3 的序列中含有連續兩個零的有 000，001，002，100，200，其中 000 貢獻


2 次 00，其餘各貢獻 1 次 00，故 $a(3) = 6$ 。則 $a(5)$ 的值為 (17-1) (17-2) (17-3)。

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

說明：本部分共有 1 題組，選填題每題 3 分，非選擇題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

18-20 題為題組

空地上有三根與地面垂直且等高的電線桿，其底座在一直線上且間距相等。某甲以單點透視法在畫布上畫這三根電線桿。在畫布上設坐標系，使得電線桿皆與 y 軸平行，三根底座的點分別為 $A_1(0,0)$ 、 A_2 、 A_3 ，都在直線 $L: x+3y=0$ 上；三根頂端的點分別為 $B_1(0,3)$ 、 B_2 、 B_3 ，都在直線 $M: 2x-3y+9=0$ 上，如圖所示。已知 $\overline{A_3B_3} = 2\overline{A_1B_1}$ ，且由單點透視法可知直線 A_1B_3 與直線 A_3B_1 的交點在直線 A_2B_2 上。設 L 和 M 相交於 P 點（此點又稱為「消失點」）。根據上述，試回答下列問題。



18. 若向量 $\overrightarrow{PA_1} = k \overrightarrow{PA_3}$ ，則 k 的值為 $\frac{\textcircled{18-1}}{\textcircled{18-2}}$ 。（化為最簡分數）（選填題，3 分）

19. 試求 P 與 B_3 這兩點的坐標。（非選擇題，6 分）

20. 若有隻蜜蜂恰好停在中間那根電線桿上距離底座與頂端的長度比為 1:2 的位置上。某甲想在這個畫布的線段 A_2B_2 上畫出這隻蜜蜂，假設畫布上蜜蜂位置為 Q 點，即點 Q 到線段 A_2B_2 的底座 A_2 與到線段 A_2B_2 頂端 B_2 的長度比為 1:2，試求 Q 點坐標。（非選擇題，6 分）

參考公式及可能用到的數值

1. 首項為 a ，公差為 d 的等差數列前 n 項之和為 $S = \frac{n(2a + (n-1)d)}{2}$

首項為 a ，公比為 $r (r \neq 1)$ 的等比數列前 n 項之和為 $S = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$

2. $\triangle ABC$ 的正弦定理： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ （ R 為 $\triangle ABC$ 外接圓半徑）

$\triangle ABC$ 的餘弦定理： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

3. 一維數據 $X: x_1, x_2, \dots, x_n$ ，

算術平均數 $\mu_X = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$

標準差 $\sigma_X = \sqrt{\frac{1}{n}[(x_1 - \mu_X)^2 + (x_2 - \mu_X)^2 + \dots + (x_n - \mu_X)^2]} = \sqrt{\frac{1}{n}[x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2] - n\mu_X^2}$

4. 二維數據 $(X, Y): (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ，

相關係數 $r_{X,Y} = \frac{(x_1 - \mu_X)(y_1 - \mu_Y) + (x_2 - \mu_X)(y_2 - \mu_Y) + \dots + (x_n - \mu_X)(y_n - \mu_Y)}{n\sigma_X\sigma_Y}$

迴歸直線（最適合直線）方程式 $y - \mu_Y = r_{X,Y} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} (x - \mu_X)$

5. 參考數值： $\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{3} \approx 1.732$, $\sqrt{5} \approx 2.236$, $\sqrt{6} \approx 2.449$, $\pi \approx 3.142$

6. 對數值： $\log 2 \approx 0.3010$, $\log 3 \approx 0.4771$, $\log 5 \approx 0.6990$, $\log 7 \approx 0.8451$

財團法人大學入學考試中心基金會

112 學年度學科能力測驗

數學 B 考科

答題卷

※考試開始鈴響起，經確認確為本人之應試號碼與姓名後，於「確認後考生簽名」欄以**正楷簽全名**。使用備用答題卷者，請務必於「確認後考生簽名」欄簽全名。
※請詳閱試題本上作答注意事項與答題卷劃記及書寫注意事項。
※選擇題正確作答樣例：☐A ☐B ☒C ☐D

第壹部分、選擇（填）題（占 85 分）

注意：考生如未能劃滿方格，或不依試題本之作答注意事項劃記致機器無法正確辨識答案時，恐將影響成績。

應試號碼、條碼、姓名（不得污損、塗改或破壞）


確認答題卷應試號碼與姓名正確無誤


確認後 考生簽名	請用正楷簽全名
-------------	--------------------

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13-1													
13-2													
14-1													
14-2													
15-1													
15-2													
16-1													
16-2													
16-3													
17-1													
17-2													
17-3													

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

題號	作答區 注意：1.應依據題號順序，於作答區內作答。2.除另有規定外，書寫時應由左至右橫式書寫。3.作答須清晰，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。4.不得於作答區書寫姓名、應試號碼或無關之文字、圖案符號等。
18-1	【請用 2B 鉛筆 作答】
18-2	【請用 2B 鉛筆 作答】
19	【請用黑色墨水的筆作答】

題號	作答區
	注意：1.應依據題號順序，於作答區內作答。2.除另有規定外，書寫時應由左至右橫式書寫。3.作答須清晰，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。4.不得於作答區書寫姓名、應試號碼或無關之文字、圖案符號等。
	【請用<u>黑色墨水</u>的筆作答】 
20	

題號	作答區
	注意：1.應依據題號順序，於作答區內作答。2.除另有規定外，書寫時應由左至右橫式書寫。3.作答須清晰，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。4.不得於作答區書寫姓名、應試號碼或無關之文字、圖案符號等。
	【請用<u>黑色墨水</u>的筆作答】 
20	

112 學年度學科能力測驗
數學 B 考科選擇（填）題答案

題號	答案	題號		答案	題號	答案
1	1	13	13-1	7	19	／
2	2		13-2	3	20	／
3	4	14	14-1	9		
4	3		14-2	0		
5	5	15	15-1	2		
6	3		15-2	2		
7	4	16	16-1	6		
8	2,4		16-2	2		
9	3,4,5		16-3	5		
10	1,5	17	17-1	1		
11	1,4		17-2	0		
12	1,3		17-3	8		
		18	18-1	1		
			18-2	2		

※ 答案「／」者，表示該題為非選擇題。


112 學年度學科能力測驗數學 B 考科 非選擇題滿分參考答案與評分原則

112 年學科能力測驗數學 B 考科的非選擇題共有 2 題，其中第 19 題每題為 6 分；第 20 題每題為 6 分，總計 12 分。

本文謹提供非選擇題各題滿分參考答案與評分原則供各界參考，詳細評分原則說明與部分學生作答情形，請參閱本中心將於 4 月 17 日出刊的第 336 期《選才電子報》。以下提供 112 年學科能力測驗數學 B 考科中，非選擇題各題的滿分參考答案及評分原則：

第 19 題

一、滿分參考答案：



解聯立方程式 $\begin{cases} 2x - 3y + 9 = 0 \\ x + 3y = 0 \end{cases}$ ，得 $P(-3, 1)$ 。

【法一】

因為 $\overrightarrow{PA_3} = 2\overrightarrow{PA_1}$ ，所以 A_1 為 P 與 A_3 的中點。由 $P(-3, 1)$ 得 A_3 的坐標為 $(3, -1)$ 。

因為 $\overline{A_3B_3} = 2\overline{A_1B_1} = 6$ ，故 B_3 的坐標為 $(3, 5)$ 。

【法二】

因為 $\triangle PA_1B_1 \sim \triangle PA_3B_3$ 、 $\overline{PA_3} = 2\overline{PA_1}$ ，所以 $\overline{PB_3} = 2\overline{PB_1}$ 。

因為 $P(-3,1)$ 得 B_3 的坐標為 $(3,5)$ 。

【法三】

因 $\overline{A_1B_1} = 3$ ，得 $\overline{A_3B_3} = 2\overline{A_1B_1} = 6$ 。

設 $B_3(x,y)$ ，所以 $A_3(x,y-6)$ ，將 A_3 代入 L 方程式，得 $x+3(y-6)=0$ ，

解聯立方程式 $\begin{cases} 2x-3y+9=0 \\ x+3(y-6)=0 \end{cases}$ ，得 B_3 的坐標為 $(3,5)$ 。


二、評分原則：

1. 根據題意，能求解聯立方程式得 P 。

2. 利用平行線截比例線段得 $\overline{PB_3} = 2\overline{PB_1}$ ，進而求出 B_3 ；或由 A_1 為 P 與 A_3 的中點，先求出 A_3 ，再利用 $\overline{A_3B_3} = 2\overline{A_1B_1} = 6$ 求得 B_3 。

第 20 題

一、滿分參考答案：



策略一：先求 $\overline{A_2B_2}$ 上的點

【法一】

設 $\overline{A_1B_3}$ 和 $\overline{A_3B_1}$ 的交點為 R ，由題意知 $\overline{A_1B_1}$ 平行於 $\overline{A_3B_3}$ ，

故 $\Delta RA_1B_1 \sim \Delta RB_3A_3$ 。

因為 $\overline{A_3B_3} = 2\overline{A_1B_1}$ ，所以 $\overline{A_1R} : \overline{RB_3} = 1:2$ 。

由題意知 R 位於 $\overline{A_2B_2}$ ，且 $\overline{A_2B_2}$ 平行於 $\overline{A_3B_3}$ ，得 $\Delta A_1A_2R \sim \Delta A_1A_3B_3$ ，

故 $\overline{A_1A_2} : \overline{A_2A_3} = 1:2$ 。由分點公式得 $A_2(1, \frac{-1}{3})$ 。

同理可得 $\overline{B_1B_2} : \overline{B_2B_3} = 1:2$ ，由分點公式得 $B_2(1, \frac{11}{3})$ 。

因為 $\overline{A_2Q} : \overline{QB_2} = 1:2$ ，由分點公式，計算 $\frac{2}{3}(1, \frac{-1}{3}) + \frac{1}{3}(1, \frac{11}{3})$ ，得 $Q(1, 1)$ 。

【法二】

設 $\overline{A_1B_3}$ 和 $\overline{A_3B_1}$ 的交點為 R ，由 $\overline{A_1B_3}$ 和 $\overline{A_3B_1}$ 的直線方程式，

解聯立方程式 $\begin{cases} 5x - 3y = 0 \\ 4x + 3y = 9 \end{cases}$ ，得 $R(1, \frac{5}{3})$ 。

因為 R 位於 $\overline{A_2B_2}$ ，且 $\overline{A_2B_2}$ 平行於 y 軸，以 $x=1$ 代入 $L: x+3y=0$ ，

得 $A_2(1, \frac{-1}{3})$ 。

因為 R 為 $\overline{A_2B_2}$ 中點，故 $\overline{A_2Q} : \overline{QR} = 2:1$ ，

由分點公式，計算 $\frac{2}{3}(1, \frac{5}{3}) + \frac{1}{3}(1, \frac{-1}{3})$ ，得 $Q(1, 1)$ 。

【法三】

設 $\overline{A_1B_3}$ 和 $\overline{A_3B_1}$ 的交點為 R ，由 $\overline{A_1B_3}$ 和 $\overline{A_3B_1}$ 的直線方程式，

解聯立方程式 $\begin{cases} 5x - 3y = 0 \\ 4x + 3y = 9 \end{cases}$ ，得 $R(1, \frac{5}{3})$ 。

由題意知 $\overline{A_1B_1}$ 平行於 $\overline{A_3B_3}$ ，故 $\Delta RA_1B_1 \sim \Delta RB_3A_3$ 。

因為 $\overline{A_3B_3} = 2\overline{A_1B_1}$ ，所以 $\overline{A_1R}:\overline{RB_3} = 1:2$ 。

又 $\overline{A_1B_1}$ 、 $\overline{A_2B_2}$ 和 $\overline{A_3B_3}$ 均為平行線，且 $\overline{A_1B_1} = 3$ 和 $\overline{A_3B_3} = 6$

得 $\overline{A_2B_2} = 3 \times \frac{2}{3} + 6 \times \frac{1}{3} = 4$ 。

因為 R 為 $\overline{A_2B_2}$ 的中點，且 $\overline{A_2Q}:\overline{QB_2} = 1:2$ ，得 $\overline{QR} = \frac{2}{3}$ 。故 $Q(1,1)$ 。

【法四】

由題意知 $\overline{A_1B_1}$ 平行於 $\overline{A_3B_3}$ ，故 $\Delta RA_1B_1 \sim \Delta RB_3A_3$ 。

因為 $\overline{A_3B_3} = 2\overline{A_1B_1}$ ，所以 $\overline{A_1R}:\overline{RB_3} = 1:2$ 。


又 $\overline{A_1B_1}$ 、 $\overline{A_2B_2}$ 和 $\overline{A_3B_3}$ 均為平行線，且 $\overline{A_1B_1} = 3$ 和 $\overline{A_3B_3} = 6$

得 $\overline{A_2B_2} = 3 \times \frac{2}{3} + 6 \times \frac{1}{3} = 4$ 。

設 $Q(x, y)$ ，因為 $\overline{A_2Q}:\overline{QB_2} = 1:2$ ，所以 $A_2(x, y - \frac{4}{3})$ 、 $B_2(x, y + \frac{8}{3})$ ，

分別代入 L 、 M 的方程式，解
$$\begin{cases} x + 3(y - \frac{4}{3}) = 0 \\ 2x - 3(y + \frac{8}{3}) + 9 = 0 \end{cases}$$
，因此 $Q(1,1)$ 。

策略二：先求 $\overline{PQ}$ 上的點



【法五】

設 $\overline{PQ}$ 和 $\overline{A_1B_1}$ 的交點為 C ，因為 $\overline{A_2Q}:\overline{QB_2}=1:2$ ，所以 $\overline{A_1C}:\overline{CB_1}=1:2$ 。

由分點公式，計算 $\frac{2}{3}(0,0)+\frac{1}{3}(0,3)$ ，得 $C(0,1)$ 。

設 $\overline{A_1B_3}$ 和 $\overline{A_3B_1}$ 的交點為 R ，由題意知 $\overline{A_1B_1}$ 平行於 $\overline{A_3B_3}$ ，

故 $\Delta RA_1B_1 \sim \Delta RB_3A_3$ 。

因為 $\overline{A_3B_3}=2\overline{A_1B_1}$ ，所以 $\overline{A_1R}:\overline{RB_3}=1:2$ 。

由題意知 R 位於 $\overline{A_2B_2}$ ，且 $\overline{A_2B_2}$ 平行於 $\overline{A_3B_3}$ ，得 $\Delta A_1A_2R \sim \Delta A_1A_3B_3$ ，

故 $\overline{A_1A_2}:\overline{A_2A_3}=1:2$ 。又 $\overline{PA_1}=\overline{A_1A_3}$ ，因此 $\overline{PA_2}:\overline{PA_1}=4:3$ 。

因為 $\Delta PA_1C \sim \Delta PA_2Q$ ，得 $\overline{PQ}:\overline{PC}=4:3$ 。

所以 $\overrightarrow{PQ}=\frac{4}{3}[(0,1)-(-3,1)]=(4,0)$ ，得 $Q(1,1)$ 。

【法六】

設 $\overrightarrow{PQ}$ 與 $\overline{A_1B_1}$ 、 $\overline{A_3B_3}$ 的交點分別為 C 、 D 。因為 $A_3(3,-1), B_3(3,5)$ ，

且 $\overline{A_1C}:\overline{CB_1}=\overline{A_3D}:\overline{DB_3}=1:2$ ，得 $C(0,1)$ 、 $D(3,1)$

因為 $\overline{A_1A_2}:\overline{A_2A_3}=1:2$ ，所以 $\overline{CQ}:\overline{QD}=1:2$ ，得 $Q(1,1)$ 。

二、評分原則：

1.可採策略一「先求 $\overline{A_2B_2}$ 上的點」利用平行線截比例線段推得出 A_2 、 B_2 、 R 、 $\overline{A_2B_2}=4$ 等四個訊息中的兩個，進而求出 Q 。

2.可採策略二「先求 $\overrightarrow{PQ}$ 上的點」利用平行線截比例線段推得出 C ，再利用線段比例 $\overline{PQ}:\overline{PC}=4:3$ ，進而求出 Q ；亦或先求出 C 、 D 兩點，再用線段比例 $\overline{CQ}:\overline{QD}=1:2$ ，進而求出 Q 。